



Без Атаброн®

С Атаброн®

Атаброн®, КС

Действующее вещество:
Хлорфлуазурон (107 г/л)

Более подробная
информация
о продукте



Преимущества


Контроль широкого спектра чешуекрылых, жесткокрылых и прямокрылых вредителей

Продолжительный период защиты — более 2-х недель

Короткий период ожидания, идеален для завершающих обработок плодоносящего сада

Регламент применения

Культура	Вредитель	Норма применения	Способ, время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)
Яблоня	Яблонная плодожорка, листовертки	0,5–0,75 л/га	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 800–1500 л/га	7 (2)



Без Теппеки®

С Теппеки®

Более подробная информация о продукте

Теппеки®, ВГ

Действующее вещество:
Флониамид (500 г/кг)



Преимущества

Высокоэффективен против всех видов тлей

Дополнительно контролирует щитовок, белокрылок и трипсов

Быстрый антифидинговый эффект — остановка питания уже через 30 минут

Системное и трансламинарное действие — уничтожает скрытоживущих вредителей

Длительная защита — до 30 дней

Безопасен для полезной энтомофауны и опылителей (совместим с ИСЗ)

Регламент применения

Культура	Вредитель	Норма применения	Способ, время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)
Яблоня	Тля	0,13–0,15 л/га	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 800–1500 л/га	55 (3)